VENETO AGRICOLTURA

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

ECKE Serie Primero

2010

Vaso 14 Serra (T bassa) invaso sett.31

2011

Vaso 17 **serra (T media)** **invaso sett. 27**

Vaso 14 **serra (T media)** **invaso sett. 31**

2012

Vaso 14 Tunnel (T media) invaso sett.31

Vaso 10 Serra (T media) invaso sett.31

2012

Vaso 14 Tunnel (T media) invaso sett.31

Vaso 10 Serra (T media) invaso sett.31

RISULTATI PROVE DURATA*

- **Fine gennaio-2010 (coltivate in serra)**

insacchettata 4 gg **non insacchettata**

*Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- Serie omogenea per struttura della pianta e caratteristiche delle infiorescenze.
- Le Red è più vigorosa e precoce delle altre, e ha anche una maggiore tendenza all'apertura dei rami. La legatura può quindi essere meno indispensabile soprattutto per la White e la Glitter.
- Buono il bianco della White, tra i migliori nelle varietà a foglia scura.
- L'abbassamento della T di coltivazione non è consigliato per la Pink e la White, che, essendo tardive, rispondono con infiorescenze molto piccole.
- Un contenuto abbassamento della T è possibile invece nella Glitter, in cui anche una leggera riduzione del diametro delle infiorescenze non pregiudica in modo importante l'apprezzamento della varietà.
- Per tutte quindi si consiglia di mantenere almeno 18° in ottobre, da ridurre poi gradualmente per quanto possibile in funzione della maturazione raggiunta e dell'andamento stagionale.
- Tutte sono caratterizzate da un'ottima tenuta post vendita.