



LINEA TVT 90 s6 33/5-1-3-2-2-2 (6)

Cichorium intybus L. gruppo *rubifolium*
Radicchio rosso di Treviso tardivo
 Conservato: *in germoteca*



CLASSE DI MATURAZIONE	MEDIO TARDIVO
------------------------------	---------------

SEMINA	PERIODO CONSIGLIATO I - II settimana di luglio
---------------	--

TRAPIANTO	PERIODO CONSIGLIATO Tra la I e II settimana di agosto
------------------	---

1 Uniformità		16 Grumolo se presente	non presente
1.1 Sviluppo	9	16.1 Uniformità	
1.2 Colore	9	16.1.1 Colore	
1.3 Maturazione	8	16.1.2 Forma	
2 Accrescimento	4-5	16.1.3 Pezzatura	
3 Colore pag. Fogliare	vr	16.2 Forma	
4 Colore Nervatura	v	16.3 Colore Foglia	
5 Consistenza Nervatura	6	16.4 Colore Nervature	
6 Margine Foglia	liscia legg.dentato	16.5 Forma Foglia	
7 Portamento Foglia	eretto	16.6 Margine Foglia	
8 Forma Foglia	lanceolata (concava)	16.7 Compattezza	
9 Sclerotinia	0	16.8 Chiusura	
10 Oidio	0	16.9 Pezzatura	2
11 Botrite	0		
12 T.B.	0		
13 Altro	0		
14 Fuori Tipo	0		
15 Prefioritura	0		



LINEA TVT 90 s5c1 33/5-1-3-4-1 (3)

Cichorium intybus L. gruppo *rubifolium*
 Radicchio rosso di Treviso tardivo
 Conservato: *in germoteca*



CLASSE DI MATURAZIONE	MEDIO TARDIVO
------------------------------	---------------

SEMINA	PERIODO CONSIGLIATO I - II settimana di luglio
---------------	--

TRAPIANTO	PERIODO CONSIGLIATO Tra la I e II settimana di agosto
------------------	---

1 Uniformità	
1.1 Sviluppo	5,5
1.2 Colore	7
1.3 Maturazione	9
2 Accrescimento	5,5
3 Colore pag. Fogliare	v con legg.screziature rosse
4 Colore Nervatura	v
5 Consistenza Nervatura	7
6 Margine Foglia	liscio legg.dentato
7 Portamento Foglia	eretto
8 Forma Foglia	lanceolata (concava)
9 Sclerotinia	0
10 Oidio	0
11 Botrite	0
12 T.B.	0
13 Altro	0
14 Fuori Tipo	0
15 Prefioritura	0

16 Grumolo se presente	non presente
16.1 Uniformità	
16.1.1 Colore	
16.1.2 Forma	
16.1.3 Pezzatura	
16.2 Forma	
16.3 Colore Foglia	
16.4 Colore Nervature	
16.5 Forma Foglia	
16.6 Margine Foglia	
16.7 Compattezza	
16.8 Chiusura	
16.9 Pezzatura	2



LINEA TVT 90 s5c1 33/5-2-2-4-1 (1)

Cichorium intybus L. gruppo *rubifolium*
Radicchio rosso di Treviso tardivo
 Conservato: *in germoteca*



CLASSE DI MATURAZIONE	MEDIO TARDIVO
------------------------------	---------------

SEMINA	PERIODO CONSIGLIATO I - II settimana di luglio
---------------	--

TRAPIANTO	PERIODO CONSIGLIATO Tra la I e II settimana di agosto
------------------	---

1 Uniformità		16 Grumolo se presente	non presente
1.1 Sviluppo	6,5	16.1 Uniformità	
1.2 Colore	6,5	16.1.1 Colore	
1.3 Maturazione	8	16.1.2 Forma	
2 Accrescimento	5,5	16.1.3 Pezzatura	
3 Colore pag. Fogliare	vr	16.2 Forma	
4 Colore Nervatura	v	16.3 Colore Foglia	
5 Consistenza Nervatura	5	16.4 Colore Nervature	
6 Margine Foglia	liscio	16.5 Forma Foglia	
7 Portamento Foglia	eretto	16.6 Margine Foglia	
8 Forma Foglia	lanceolata (concava)	16.7 Compattezza	
9 Sclerotinia	0	16.8 Chiusura	
10 Oidio	0	16.9 Pezzatura	2
11 Botrite	0		
12 T.B.	0		
13 Altro	0		
14 Fuori Tipo	0		
15 Prefioritura	0		