VENETO AGRICOLTURA

DUMMEN ORANGE

Jubilee Red

Vaso 17 Serra T media invaso sett.27

2011

2012

2013

2014

Vaso 17

2015

serra
T media

Invaso
sett.27

2016

serra
T media

Invaso
sett.26

Vaso 14

2010 **Invaso sett.31**

serra (T bassa) **tunnel (T bassa)**

2011 **Invaso sett.32**

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2012 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T molto bassa**

2013 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2015 invaso sett.31

tunnel T media T bassa

2017 invaso sett.31

Tunnel T alta T bassa

maturazione 2014 (autunno molto caldo)

- Sett. 42

- Sett.45



T impostate riscaldamen → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

RISULTATI PROVE DURATA*

- fine gennaio – 2010

da serra

non insacchettata **ins. 4 gg** **ins. + inscatolata 10 gg**

da tunnel

* Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede del 2010

Vaso 10 spuntato

2013 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

Sett.51

2014 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

•

Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** medio-vigorosa, struttura regolare con portamento a V, più marcato nel vaso 17. Nel vaso 14 a causa della grandezza delle brattee a fine coltura i rami tendono ad allargarsi. Non richiede forte uso di nanizzanti e la legatura dei rami nel vaso 17 non è indispensabile.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi orizzontali o leggermente ricadenti, colore rosso intenso. Ciazii grandi e numerosi, durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** buon risultato per quanto riguarda la colorazione, è la vegetazione a risentire di più delle basse T, con comparsa di clorosi fogliari. Ottima la resistenza alla botrite, anche con brattea matura e condizioni favorevoli alla malattia.

•**TRASPORTO/DURATA:** ottimo risultato sia come tenuta delle foglie che delle brattee, soprattutto nelle piante coltivate a T media.

•**NOTE:** Varietà interessante per la struttura, la regolarità e le belle infiorescenze. Buone anche la resistenza al trasporto e la durata post vendita. Manifesta talora una ramificazione non uniforme, di solito in concomitanza con stagioni particolarmente calde. A fine coltura però le infiorescenze grandi e vistose coprono bene la chioma rendendo tali difetti generalmente meno evidenti e gravi di quanto non appaia durante la coltivazione. Buon risultato in tutte le taglie testate.

Esiste anche una serie di colorati, molto in linea con la Red (vedi schede specifiche)