VENETO AGRICOLTURA

Albani & Ruggieri

Glamour

Vaso 17

2013

Serra
(T media)

Invaso
sett.27

2014

Serra
(T media)

Invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
(T media)
Invaso
sett.27

2016

serra
(T media)
Invaso
sett.26

Vaso 14

2014 invaso sett.31

tunnel **T media** **T bassa**

2015 invaso sett.31

tunnel **T media** **T bassa**

Vaso 14

2016

Invaso sett.31

tunnel **T media** **T bassa**

2017

Invaso sett.31

tunnel **T alta** **T bassa**

maturazione 2014 (autunno molto caldo)

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 5

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 50

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

Vaso 10 spuntato

2013 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

Sett.51

2014 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** Pianta regolare, nel vaso 14 medio vigorosa, più contenuta la crescita nel vaso 17. La ramificazione è abbondante anche con rami secondari, il portamento è a V leggermente aperta. Consigliabile la legatura nei vasi grandi.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi, orizzontali, molto regolari, di colore rosso intenso, con ciazii numerosi, grandi e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** Risponde bene all'abbassamento della T di coltivazione a fine stagione. Condizioni drastiche nelle fasi precedenti rischiano di causare la comparsa di clorosi fogliari. Le brattee mature hanno mostrato, in condizioni favorevoli alla malattia, una moderata sensibilità alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** da alcuni test effettuati ha dato indicazioni di buona tenuta delle brattee, sufficiente quella delle foglie.

•**NOTE:** Interessante per l'uniformità, la regolarità e le infiorescenze appariscenti, di sicuro effetto estetico. Coltivabile nelle taglie da piccole a medio-grandi, eventualmente in queste ultime anticipando l'invaso per aumentarne la taglia. Da tenere presente nella coltivazione che nelle prime fasi di crescita appare molto vigorosa, successivamente la crescita rallenta. Richiede quindi, nonostante l'impressione iniziale, scarso uso di nanizzanti. Dall'induzione richiede inoltre irrigazioni contenute.