VENETO AGRICOLTURA

DUMMEN ORANGE

Primero - serie

Vaso 14

2010

Serra T bassa invaso sett.31

Red

White

Glitter

Pink

2011

Primero Glitter

Vaso 17

Serra
T media

invaso
sett. 27

Vaso 14

serra T media

invaso sett. 31

2012

Vaso 14 **Tunnel** **T media invaso sett.31**

Red

White

Vaso 10 **Serra** **T media invaso sett.34**

Glitter

2012

Vaso 14 Tunnel (T media) invaso sett.31

Vaso 10 Serra (T media) invaso sett.31

2016 Vaso 14 invaso sett.31

White

tunnel T media

Pink

Serra T media

Glitter

serra T media tunnel T bassa

2017

Primero Glitter

Vaso 14 **invaso sett.31**

Tunnel **T alta** **T bassa**

2018 **Vaso 14**

Serra **T alta** **Invaso sett.31**

Red

White

2018 **Vaso 10**

Red

serra
T alta

Invaso
sett.34

White

Glitter

T impostata riscaldamento alta

maturazione 2018

Sett	Red	White	Glitter
42			
45			
48			
51			

RISULTATI PROVE DURATA*

- **Fine gennaio-2010 (coltivate in serra)**

insacchettata 4 gg **non insacchettata**

*Per i dettagli delle prove vedere premesse alle schede degli anni relativi

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- Serie abbastanza omogenea per le caratteristiche della pianta delle infiorescenze. La Red e la Pink sono più vigorose e tendono di più all'apertura dei rami basali, la White e Glitter più compatte e a V.
- La Pink e la Red sono un po' più precoci. Discreto il bianco crema della White e il rosa della Pink. Discreta anche la stabilità della colorazione della Glitter, con % elevata di piante corrispondenti alla colorazione desiderata e minor presenza di piante bianche.
- Tutta questa serie è caratterizzata da una grande rusticità delle piante, che rispondono bene a un contenuto abbassamento della T di coltivazione. Tuttavia ciò comporta una riduzione della dimensione delle brattee, il cui impatto è diverso seconda del colore. Ai due estremi come effetti stanno la Glitter, e la White: nella prima infatti, essendo una colorazione molto gradita, la dimensione delle brattee può non influenzare negativamente la commerciabilità delle piante, mentre nella seconda all'effetto di riduzione delle brattee si somma il peggioramento della colorazione.
- Per valorizzarne la fioritura si consiglia quindi di mantenere almeno 18° in ottobre, e almeno 16° in novembre. Utile è anche destinare a queste le posizioni più luminose all'interno della serra.
- Tutte sono caratterizzate da un'ottima tenuta post vendita, soprattutto per la tenuta delle foglie.