

Albani & Ruggieri **Glamour**



2013

Serra T media

Invaso sett.27



2014

Serra T media

Invaso sett.27



2015

Serra T media

Invaso sett.27



2016

Serra T media

Invaso sett.26



2015 invaso sett.31





tunnel T media T bassa

2016 invaso sett.31



tunnel T media T bassa

2017

invaso sett.31



Tunnel Talta

tunnel T bassa

2018

invaso sett.31



Serra T alta

tunnel T bassa

maturazione 2015

• Sett. 42

• Sett.45



T impostate media bassa riscaldamento

• Sett.48

• Sett. 51



maturazione 2016

• Sett. 42

• Sett.45



T impostate

riscaldamento

media

bassa

• Sett.47

• Sett. 50



maturazione 2017

• Sett. 42



T impostate riscaldamento



alta

bassa







• Sett.48



maturazione 2018*

Sett.42



T impostate riscaldamento

alta

bassa

Sett.45



Sett.48

Sett.50



^{*}autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

2013 Serra T media invaso sett. 34

ARS301

Sett.51

2014 Serra T media invaso sett. 34



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- •PIANTA: Pianta regolare, nel vaso 14 medio vigorosa, più contenuta la crescita nel vaso 17. La ramificazione è abbondante anche con rami secondari, il portamento è a V leggermente aperta. Consigliabile la legatura nei vasi grandi.
- •FIORITURA: media precocità, infiorescenze grandi, orizzontali, molto regolari, di colore rosso intenso, con ciazii numerosi, grandi e durevoli.
- •RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': Risponde bene all'abbassamento della T di coltivazione a fine stagione. Condizioni drastiche nelle fasi precedenti rischiano di causare la comparsa di clorosi fogliari. Le brattee mature hanno mostrato, in condizioni favorevoli alla malattia, una moderata sensibilità alla botrite.
- •TRASPORTO/DURATA: da alcuni test effettuati ha dato indicazioni di buona tenuta delle brattee, sufficiente quella delle foglie.
- •NOTE: Interessante per l'uniformità, la regolarità e le infiorescenze appariscenti, di sicuro effetto estetico. Coltivabile nelle taglie da piccole a medio-grandi, eventualmente in queste ultime anticipando l'invaso per aumentarne la taglia. Da tenere presente nella coltivazione che nelle prime fasi di crescita appare molto vigorosa, successivamente la crescita rallenta. Richiede quindi, nonostante l'impressione iniziale, scarso uso di nanizzanti. Dall'induzione richiede inoltre irrigazioni contenute.