VENETO AGRICOLTURA

Albani & Ruggieri

Splendente

Vaso 17

2013

serra
T media

Invaso
sett. 27

2014

serra
T media

Invaso
sett. 27

Vaso 17

2015

serra
T media

Invaso
sett. 27

2016

serra
T media

Invaso
sett. 26

Vaso 14

2015 **Invaso sett.31**

tunnel T media T bassa

2016 **Invaso sett.31**

tunnel T media T bassa

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 50

maturazione 2017

T impostate riscaldamento → **alta**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42



T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

Foto non disponibile

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

Vaso 10

2014

Serra
T media

invaso
sett. 34

Sett. 51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** Vigoria medio-bassa, pianta compatta e regolare. Rami robusti senza ramificazione secondaria, portamento a V aperta. Consigliabile la legatura nel vaso 17, in cui produce una pianta bassa e arrotondata.
- **FIORITURA:** precoce, infiorescenze medio-grandi, orizzontali, di colore rosso intenso, con ciazii numerosi, grandi e appariscenti.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ottima risposta nel test a bassa T. In condizioni favorevoli alla malattia è risultata sensibile alla botrite, sia sulle brattee mature che sullo stelo.
- **TRASPORTO/DURATA:** da un piccolo test preliminare, effettuato con piante molto mature, ha dato segnali di durata non molto soddisfacente soprattutto per le foglie.
- **NOTE:** Interessante per la regolarità, l'uniformità e le infiorescenze appariscenti. Nelle primissime fasi post invaso la crescita è forte, ma poi rallenta ed è molto regolare, scarsa o nulla quindi la richiesta di trattamenti nanizzanti. Risponde molto bene alla coltivazione a bassa T. Da evitare invece le condizioni che ne favoriscano la sovramaturazione, soprattutto in ambienti di coltivazione umidi. Consigliabile soprattutto per vasi medio-piccoli e per aprire la stagione di vendita.