


La fauna dell'Oasi di Cà Mello



Nel corso dell'anno, le diverse stagioni vedono il susseguirsi di differenti specie di uccelli che frequentano l'Oasi. In estate, all'interno del canneto, nidificano tra le altre la Cannaiola comune (*Acrocephalus scirpaceus*), il Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*), il Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'Airone rosso (*Ardea purpurea*), il Porciglione (*Rallus aquaticus*) ed il Cuculo (*Cuculus canorus*). Quest'ultimo non costruisce un proprio nido ma approfitta di quello di un piccolo passeriforme, deponendovi un uovo che l'ospite crederà proprio e accudirà come tale.

Nelle zone cespugliate dell'Oasi, dove la Garzetta (*Egretta garzetta*) e la Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) si riuniscono a nidificare in una colonia, detta garzaia, si possono udire i canti dell'Usignolo (*Luscinia megarhynchos*) e della Capinera (*Sylvia atricapilla*). Gli specchi d'acqua sono sorvolati dalla Sterna comune (*Sterna hirundo*) e dalla Sterna zampenere (*Sterna nilotica*) alla ricerca di piccoli pesci; di questi ultimi si nutre anche il Martin pescatore (*Alcedo atthis*) che invece è solito scrutare la superficie dell'acqua posato su un ramo o una canna.



In inverno, l'assenza di alcune specie migratrici nel canneto è colmata dalla comparsa del Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*) e del Pendolino (*Remiz pendulinus*), mentre fra gli arbusti e i cespugli di rovi sono presenti il Pettirosso (*Erithacus rubecula*), la Passera scopaiola (*Prunella modularis*) e lo Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*). Al margine fra gli specchi d'acqua e la vegetazione igrofila si possono scorgere anche il Germano reale (*Anas platyrhynchos*) e l'Alzavola (*Anas crecca*).

Fra i Mammiferi presenti nell'Oasi ricordiamo il Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), il Topolino delle risaie (*Micromys minutus*), la Donnola (*Mustela nivalis*), la Volpe (*Vulpes vulpes*) e la Nutria (*Myocastor coypus*), specie alloctona di origine sudamericana che si è naturalizzata a seguito di introduzioni per la produzione commerciale di pellicce.

Fra gli Anfibi dell'Oasi spiccano le sonore rane verdi (*Rana lessonae* e *Rana kl. esculenta*), che comprendono due specie molto simili dal punto di vista morfologico e cromatico e che si presentano sempre in popolazioni "miste", la Rana dalmatina (*Rana dalmatina*) ed il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*).

I Rettili più diffusi fra la vegetazione igrofila e gli specchi d'acqua sono la Natrice dal collare (*Natrix natrix*) e la Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), mentre sulle sponde erbose con cespugli si possono avvistare facilmente il Biacco (*Hierophis viridiflavus*) ed il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*).

