

Frumento tenero 2011-12: **Confronto varietale SU SODO - strip test** (az. Vallevicchia)

Nome varietà'	Classe	Spigatura	Altezza	Peso hL	fittezza	umidità	Prod. t/ha
	tecnologica	da 1/4				alla raccolta	13% um.
		gg	cm	kg/hL	0-9	%	
FORBLANC	FPS	35	88	77,4	7,8	12,4	9,11
SIRTAKY	FP	35	82	76,3	7,8	12,4	9,06
GENESI	FPS	36	87	79,2	7,7	12,6	8,27
SORIAL	FPS	39	74	73,9	7,5	12,3	8,23
BLASCO	FPS	32	87	84,1	8,7	13,0	8,02
BOLOGNA	FF	35	83	80,8	7,3	13,0	7,92
Media		35	84	78,6	7,8	12,6	8,43
d.m.s. 5%							0,721
C.V.							5,09

Le migliori varietà, appartenenti al primo gruppo di significatività, sono evidenziate in colore

SCHEDA AGRONOMICA

TERRENO: medio impasto

PRECESSIONE: soia

LAVORAZIONE: non lavorato bel 2011; semina su sodo

CONCIMAZIONE: alla semina localizzato su banda 280 kg/ha di complesso 25-15

SEMINA: 13-14 ottobre 2011

DENSITA' di SEMINA: 450 semi germinabili/mq

DISERBO pre-semina: Roundup 4l/ha il 10 ottobre 2011

DISERBO post-emergenza: Calibar Top + Biopower 0,3l + 1l/ha il 2 aprile 2012

CONCIMAZIONE DI COPERTURA : 1° intervento - 150 kg/ha di Nitr. Amm.co l'1 febbraio 2012

: 2° intervento - 150 kg/ha di urea il 17 aprile 2012

TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI: Amistar Extra 1l/ha in data 10 aprile

RACCOLTA: 3 luglio 2012