



Alimentazione del pollo da carne

*Per produzioni di qualità
utilizzando prodotti legati al territorio*

Le razze a lento accrescimento devono essere alimentate in base alle loro esigenze e alle loro necessità. Per le produzioni di qualità l'alimentazione non deve essere un fattore di crescita ma deve mantenere gli animali in una costante situazione di benessere. La somministrazione di razioni troppo energetiche favorisce un veloce accrescimento degli animali predisponendoli però a situazioni di stress e favorendo l'insorgenza di malattie. Anche razioni scarse o sbilanciate invece indeboliscono i polli favorendo l'insorgenza di malattie. È quindi necessario distribuire una razione alimentare bilanciata che favorisca, in base alle caratteristiche di razza, un armonico sviluppo degli animali e delle loro difese immunitarie.

Si indica di seguito un esempio di razionamento alimentare per polli da carne utilizzando come integratore proteico un alimento commerciale al 23% di proteine miscelato con granaglie miste.

Prime 4[^]-5[^] settimane di vita

Somministrate un alimento commerciale, in forma sbriciolata, al 22-23% di proteine. L'alimento deve essere distribuito a volontà e cioè le mangiatoie devono essere sempre piene durante tutte le ore della giornata. Già dalla terza settimana di vita è possibile distribuire erbe e verdure fresche utilizzando un'apposita rastrelliera.

Dalla 5[^] alla 10[^] settimana di vita

Durante questo periodo distribuite una miscela aziendale realizzata con 10 parti di alimento per pulcini al 22-23% di proteine e 3 parti di granaglie miste. Continuate a distribuire erbe e verdure fresche utilizzando un'apposita

rastrelliera. Fino all'8[^] settimana di vita la miscela deve essere distribuita a volontà: le mangiatoie devono sempre essere provviste di mangime durante tutte le ore della giornata. Dopo l'8[^] settimana di vita la razione alimentare deve essere razionata: al mattino gli animali devono trovare le mangiatoie vuote e quindi escono al pascolo in cerca di erbe, semi e insetti. Nella tarda mattinata, o nel primo pomeriggio distribuite la razione alimentare nelle mangiatoie.

Un'alimentazione razionata, a partire dall'8[^] settimana di vita, favorisce uno sviluppo dell'intestino preparando gli animali alla fase di ingrasso. Un intestino ben sviluppato permette un maggior assorbimento delle sostanze nutritive nella fase di ingrasso; un intestino poco sviluppato diminuisce l'assorbimento delle sostanze nutritive durante l'ingrasso e aumenta la quantità di deiezioni.

Dopo la 10[^] settimana di vita

Dopo la 10[^] settimana di vita l'alimentazione deve essere costituita da una miscela in parti eguali realizzata mescolando un alimento per pulcini al 22-23% di proteine e 3 granaglie miste. La somministrazione della miscela deve essere razionata: al mattino gli animali devono trovare le mangiatoie vuote, la razione alimentare deve essere distribuita nella tarda mattinata, o nel primo pomeriggio.

Ultime 3-4 settimane

La qualità delle carni dipende da molti fattori come la razza degli animali e gli alimenti distribuiti. Un altro fattore che determina la qualità è la loro marezza delle carni e cioè quella piccola quantità di grasso che si accumula tra le fibre muscolari durante la fase di ingrasso. Per


Come alimentare i polli all'ingrasso di razze a lento accrescimento

consentire questo accumulo è importante sacrificare gli animali all'inizio della maturità sessuale (al primo canto) mentre per favorire la marezza si consiglia, durante le ultime 3-4 settimane, di alimentare gli animali a volontà: le mangiatoie devono essere sempre piene durante tutte le ore della giornata.

La miscela alimentare deve essere come la precedente: miscela in parti eguali tra alimento per pulcini al 22-23% di proteine e granaglie miste.



alimento commerciale
al 22-23 % di proteine




Miscela di granaglie:
mais, grano, orzo,
avena, sorgo, ecc.

COME ALIMENTARLI

prime 4-5 settimane

da 5 a 10 settimane

dalla 10^a settimane in poi



solo alimento commerciale



10 parti

3 parti



1 parte

1 parte

COME DISTRIBUIRE GLI ALIMENTI

prime 7-8 settimane
sviluppo

accrescimento

ultime 3-4 settimane
marezza



alimentazione a volontà

alimentazione razionata

... a volontà

alimentazione a volontà: le mangiatoie devono essere sempre piene durante tutte le ore della giornata

alimentazione razionata: al mattino gli animali devono trovare le mangiatoie vuote, la razione alimentare deve essere distribuita nella tarda mattinata, o nel primo pomeriggio