

UTILIZZO TRAPPOLA YATLORf (per elateridi)

La trappola YATLORf (fig. 1) va posta con il fondo bianco interrato facendo in modo che il bordo del corpo trappola (marrone) sia coperto con terra 1-2 cm (fig. 5).

1 Il 20 marzo viene posizionata, previa posa di un palo indicatore ben visibile, la trappola al centro dell'area da monitorare con l'esca a base di feromone sessuale per *A. brevis* in posizione bassa ed il tappo in basso (fig. 2);

2 Il 10 aprile vengono prelevati da b gli insetti catturati ed aggiunto il dispenser con feromone per *A. sordidus* in posizione media (fig. 3a) ed il tappo in basso. In occasione di ciascun prelievo è opportuno procedere ad una accurata pulizia del fondo, eliminando terra e residui vari.

3 Il 10 maggio circa vengono prelevati da b gli insetti catturati e sostituito il feromone (in a) per *A. sordidus* posizionandolo nuovamente in posizione media. Va inoltre aggiunto il feromone per *A. litigiosus* nella posizione alta (fig. 4).

4 Il 10 giugno circa vengono prelevati da b gli insetti catturati e sostituita l'esca di feromone per *A. brevis* con quella per *A. litigiosus* in posizione bassa e sostituita il feromone per *A. litigiosus* in posizione alta con l'esca per *A. ustulatus*; in posizione alta si può aggiungere anche il feromone per diabrotica; in tal caso va aggiunto dell'insetticida nel fondo trappola.

5 Il 10 luglio circa vengono prelevati da b gli insetti catturati e sostituita l'esca in a per *A. ustulatus* nella stessa posizione. Va inoltre sostituito il feromone per la diabrotica.

6 Il 10 agosto vengono prelevati da b gli insetti catturati e recuperata la trappola per l'anno successivo.

COME PRELEVARE GLI INSETTI CATTURATI

Vanno utilizzate capsule Kartel 730 per *A. brevis*, *A. sordidus*, *A. litigiosus*, *A. ustulatus*

Istruzioni per il prelievo degli insetti dalla trappola:

1- la trappola va tolta dal terreno

2- Prima di aprirla inserire la trappola in un sacchetto trasparente e largo per evitare che gli insetti ancora vivi vadano persi. Staccare quindi la base dal resto della trappola facendo cadere gli insetti nel sacchetto.

3- il sacchetto viene immediatamente chiuso.

4- la trappola viene riposizionata sul terreno previa accurata pulizia del fondo.



Figura1: Trappola YATLORf



Figura2: Feromone in posizione bassa




Figura3: provetta di feromone per *A. sordidus* in posizione media a ed il tappo in basso b



Figura4: Feromone in posizione alta



Figura5: Trappola posizionata in campo