



Rossignola n.

Origine

Le prime testimonianze di questo vitigno tipico del veronese risalgono al Pollini (1824).

Caratteristiche ampelografiche

Portamento: eretto.

Apice del germoglio: molto lanuginoso, biancastro con sfumature rosa.

Foglia: media, pentagonale, pentalobata; seno peziolare a U molto aperto; lembo quasi piano, leggermente bollosa e lobi leggermente piegati a gronda; nervature di color giallastro, bronzate alla base.

Grappolo: medio (150-200 g), tronco-piramidale, alato, compatto.

Acino: obovale, di medie dimensioni, buccia molto pruinosa, sottile, di consistenza media e colore rosso-violaceo non uniforme; sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive

È una varietà tardiva sia nel germogliamento che nella maturazione; molto vigorosa, con buona fertilità delle gemme. Preferisce forme di allevamento espanse con potature lunghe e ricche.

È molto sensibile alla botrite, marciume acido e tignole. Dimostra una certa sensibilità verso peronospora, oidio, mal dell'esca, acari e cicaline; buona la resistenza alla clorosi.

Selezione clonale

Si è cercata una maggiore precocità di maturazione ed una minore sensibilità ai patogeni.



Cloni omologati

| Clone | Costitutore* | Anno omologazione | Produttività | Potenziale qualitativo | Utilizzazione (destinazione) | Sensibilità alla botrite |
|----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ISV-CV 3 | 1; 17 | 1980 | M | M | B-S | M |
| ISV-CV 7 | 1; 17 | 1980 | M-E | M-A | B-S | M |
| ISV-CV 9 | 1; 17 | 1980 | M | M-A | B-S | P |

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: **Produttività:** Ridotta, Media, Elevata; **Potenziale qualitativo:** Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d'annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile