



Tocai rosso n.

Origine

Vitigno coltivato sui Colli Berici fin dall'800; è la Garnacha tinta spagnola e il Grenache francese. È uno dei vitigni più diffusi nel Mondo. In Italia, dove è stato importato probabilmente dagli Spagnoli, si trova coltivato anche in Sardegna come Cannonao, in Umbria come Gamay perugino, in Sicilia come Alicante o Ranaccio, ecc.

Caratteristiche ampelografiche

Portamento: eretto.

Apice del germoglio: di color verde, aracnoideo.

Foglia: media, trilobata, seno peziolare a lira aperto, lembo ondulato, glabra.

Grappolo: medio (200-250 g), cilindro-conico, qualche volta alato, più o meno compatto.

Acino: medio, sferico, buccia sottile, ma consistente, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive

Germoglia tardivamente e matura in epoca media. La sua vigoria è media e la sua produzione non è generalmente elevata, anche se la fertilità delle gemme è buona (anche oltre 2).

Presenta un'ottima adattabilità ambientale, resiste bene al freddo invernale e predilige potature corte e non molto ricche.

È sensibile a peronospora, botrite e marciume acido, mentre è tollerante nei confronti dell'oidio.

Selezione clonale

Esistono diversi cloni italiani e stranieri selezionati nelle molteplici aree di coltivazione del vitigno, con l'obiettivo di migliorare la sua tolleranza alle malattie e la qualità, soprattutto polifenolica, delle uve.



Cloni omologati

Clone	Costitutore*	Anno omologazione	Produttività	Potenziale qualitativo	Utilizzazione (destinazione)	Sensibilità alla botrite
FEDIT 14 C.S.G.	3	1969				
ISV-C VI 2	1; 18	1990	M	M	N-B	M
ISV-C VI 3	1; 18	1990	M	M-A	N-B	M
ISV-C VI 17	1; 18	1990	M-R	M	B	M
CAP VS 5 (tipo Cannonao)	25	1991	M-R	A	B-M-L	M
VCR 3	2	1992	M	M-A	N-B-M	P
CFC 13 (tipo Cannonao)	14	1993	M	M-A	N-B	P
CAP VS 1 (tipo Cannonao)	25	1994	M-R	M-A	B-M	M
CAP VS 2 (tipo Cannonao)	25	1994	M	A	B	M
1 ISV - ICA PG (tipo Alicante)	1; 26	2002	M-E	M-A	N-B	M
70	ENTAV	1971	E	M	B	M
136	ENTAV	1972	R	M-A	B	-

* vedasi elenco costitutori a pag. 12