VENETO AGRICOLTURA

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Lazzeri Delta (1088)

Vaso 17

2012

serra
(T media)

invaso
sett.28

2013

serra
(T media)

invaso
sett.27

Vaso 14

2012 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T molto bassa**

2013 **Invaso sett.31**

tunnel **T media** **T bassa**

2014

Vaso 17

serra
(T media)

Invaso
sett.27

Vaso 14 invaso sett.31

tunnel **T media** **T bassa**

maturazione 2012

- Sett. 42

T media **T molto bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.51

maturazione 2013

•Sett.42

•Sett.45

T media **T bassa**

•Sett.48

•Sett.51

maturazione 2014

•Sett.42

•Sett.45

T media **T bassa**

•Sett.48

•Sett.51

Vaso 10 spuntato

2013 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

Sett.51

2014 **Serra (T media)** **invaso sett. 34**

Sett.51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, pianta molto regolare che produce rami forti ed elastici con portamento a V, e assenza di ramificazione secondaria. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la legatura dei rami non sia necessaria.

•**FIORITURA:** precoce, infiorescenze molto grandi e orizzontali, di colore rosso intenso. Ciazii grandi e abbastanza numerosi, ad apertura tardiva rispetto alla colorazione.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ottima risposta alla coltivazione a bassa T, anche nei test più drastici (2012).

Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, sensibili alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato un'ottima tenuta sia delle foglie che delle brattee.

•**NOTE:** varietà molto interessante sia per la struttura, pulita, robusta e molto regolare, che per le belle infiorescenze. Adatta a tutte le taglie testate e di facile coltivazione. La coltivazione a bassa T, oltre che possibile, è consigliata per evitare la sovramaturazione delle brattee, che oltre a peggiorarne il colore le rende anche più sensibili alla botrite.