VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA

SELECTA

Rave*

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

2017 – invaso sett.9

2018 – invaso sett.8

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017				
Varietà	**vigoria**	**portamento**	**Precocità cimato**	**diametro fiore cm**
Pink ´16	m	ea	p	3,5
Cherry	m/f	all	m/t	4,5
Violet	m/f	all	m/p	4
Blue	m	ea	m/p	4
Peach	m/f	all	m/t	4

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018				
Varietà	**vigoria**	**portamento**	**Precocità non cimato**	**diametro fiore cm**
Cherry	m/f	ea	m	4
Peach	m/f	ea	m/p	4,5

Test estivo-2017

Cherry

Pink ‘16

Peach

Violet

Blue

Test estivo-2018

Cherry

Peach

PROVE DI COLTIVAZIONE

•**MATERIALE DI PARTENZA**: talee non cimate.

•**COLTIVAZIONE**: Nel 2017 sono state cimate, nel 2018 no. Nel 2017, a causa dell'invaso tardivo, non sono stati fatti nanizzanti, nel 2018 sono invece stati praticati 2 interventi.

•**OMOGENEITA'**: valutabile solo nel 2017 in cui era presente l'intera serie, si presenta discretamente omogenea nelle vigoria e nel portamento. Qualche variazione più importante si è riscontrata nella precocità, da ricordare però che i dati del 2017 risentono della cimatura effettuata sulle talee.

TEST ESTIVI

•**VIGORIA**: da medio forte a forte, più compatta la Pink'16.

•**PORTAMENTO**: a cuscino, con buona tendenza a ricadere soprattutto nella Cherry e Peach, le più vigorose.

•**FIORITURA**: ottimo riempimento centrale e rifiorenza per tutta la stagione di prova. La Cherry nel tempo tende a perdere la variegatura a stella, migliore tenuta del colore nella Peach.

NOTE

•Serie caratterizzata dalle colorazioni, tutte con variegatura a stella.

•La differenza tra la Blue e la Violet è poco evidente in coltivazione, più visibile all'esterno.

•Da notare come l'effetto della cimatura nel 2017 abbia portato a piante più piatte e vuote al centro, nonché più tardive che nel 2018 (con i dovuti limiti, per quanto riguarda la precocità, del paragone effettuato tra 2 annate diverse).

•Utile anche l'uso dei nanizzanti, trattandosi di piante abbastanza esuberanti.