VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

# BEEKENKAMP

# Blissful Red

2016

# Vaso 17

**Serra** **T media** **Invaso sett. 27**

# Vaso 14

2014 **Invaso sett.31**

tunnel T media

2015 **Invaso sett.32**

tunnel T media T bassa

# Vaso 14

2016 invaso sett.32

**Tunnel** **T media** **T bassa**

2017 invaso sett.31

**Tunnel** **T alta**

**2019 Vaso 10 Invaso sett. 34**

**Serra T alta**

# maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

**T impostate riscaldamento** → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

# maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

**T impostate riscaldamento** → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 51

# maturazione 2017

**T impostate riscaldamento** → **alta**

- Sett. 42

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

# Maturazione 2019

**T impostata riscaldamento** → **alta**

- Sett.42

- Sett.45

- Sett.48

- Sett. 50

# INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- **PIANTA:** vigoria medio-bassa, ramificazione forte e pulita, assenza di rami secondari e perfetto portamento a V. Inutile la legatura dei rami nel vaso 17.
- **FIORITURA:** media precocità, infiorescenze non grandi, orizzontali e arrotondate, di colore rosso scuro. I ciazii sono numerosi e grandi, a maturazione tardiva.
- **RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** per le caratteristiche di vegetazione e fioritura non è consigliabile una coltivazione a bassa T: è possibile però un abbassamento nelle fasi finali, soprattutto dopo autunni caldi. Contenuta la sensibilità alla botrite della brattea matura, anche in condizioni favorevoli alla malattia.
- **TRASPORTO/DURATA:** effettuato un piccolo test preliminare con ottimo risultato sia per la tenuta delle foglie che delle brattee.
- **NOTE:** colpisce per la regolarità e l'uniformità delle piante e la notevole facilità di coltivazione anche senza uso di nanizzanti. Unica accortezza, la gestione dell'irrigazione date le esigenze idriche contenute. Particolarmente adatta a taglie medio piccole, per coltivazioni in densità destinate a insacchettamento e trasporto.