VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

DUMMEN ORANGE

Advantage Red

Vaso 17

2013

serra
T media

invaso
sett.27

2014

serra
T media

invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2015 invaso sett.31

tunnel T media T bassa

2016 invaso sett.31

tunnel T media T bassa

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019

Vaso 14 **Invaso sett.31**

Serra **T alta**

Tunnel **T bassa**

maturazione 2015

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.48

- Sett. 51

maturazione 2016

- Sett. 42

- Sett.45

T impostate riscaldamento → **media** **bassa**

- Sett.47

- Sett. 50

maturazione 2017

- Sett. 42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

maturazione 2019

- Sett.42

T impostate riscaldamento

alta **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

Vaso 10

2013 Serra (T media) invaso sett. 34

Sett. 51

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ha una ramificazione forte, abbondante, senza rami secondari. Il portamento è a V aperta: utile la legatura nel vaso 17, in cui tende a crescere più in larghezza che in altezza.

•**FIORITURA:** medio-precoce, infiorescenze grandi, orizzontali, colore rosso chiaro. I ciazii sono numerosi e grandi , appariscenti e durevoli.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** ha dato un'ottima risposta alla coltivazione a bassa T, rendendo, nelle annate con autunni particolarmente caldi, quasi indistinguibili le piante coltivate ai due regimi termici. Risulta anzi consigliabile non spingerla col riscaldamento, anche per evitare la maturazione precoce dei ciazii. Mentre infatti le brattee hanno evidenziato verso la botrite una sensibilità contenuta, la malattia, in condizioni favorevoli, trova facilmente punto d'ingresso nei grandi ciazii se molto maturi.

•**TRASPORTO/DURATA:** nei piccoli test effettuati ha evidenziato un'ottima tenuta delle brattee, discreta quella delle foglie.

•**NOTE:** varietà vigorosa e uniforme, interessante soprattutto per la fioritura appariscente. Di facile coltivazione, appare particolarmente adatta a produrre piante di effetto nelle taglie grandi per la vendita diretta, soprattutto a inizio stagione. Ottimo inoltre il risultato nel vaso 10. Nel vaso 14 dà un ottimo risultato estetico ma piante piuttosto voluminose, ciò che la rende poco adatta a coltivazioni in densità e insacchettamento. Consigliabile inoltre soprattutto in strutture dove sia gestibile l'Ur, soprattutto in caso di stagioni autunnali calde che ne favoriscano la maturazione precoce.