



LAZZERI

Roccostar Red - White



Vaso17

2014

2009

serra T media

invaso sett.27



Vaso 14

2016

invaso sett.31



Serra T media

tunnel T bassa

2019

invaso sett.31



Serra T alta

tunnel T bassa

Vaso 14

2019 White



Serra T alta Tunnel T bassa


• Sett. 42

• Sett.45



T impostate riscaldamento

Sett.47



T impostata riscaldamento

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48







• Sett.42



T impostate riscaldamento

Sett.45

• Sett.48



• Sett.42



T impostate riscaldamento

Sett.45

• Sett.48



Vaso 10

2014 Serra T media invaso sett. 34





2018 Serra Talta invaso sett. 34





Red





Serra T alta Invaso sett. 34

White





INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- •PIANTA: vigoria medio-forte, buona (abbondante nella White) ramificazione con portamento a V. Nel vaso 17 (in cui è stata testata solo la Red) la legatura è comunque consigliabile.
- •FIORITURA: medio-precoce la Red, tardiva la White, infiorescenze numerose colore rosso chiaro, nella Red, bianco crema nella White. I ciazii sono mediamente numerosi, grandi e durevoli.
- •RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': le due colorazioni hanno dato risultati molto diversi. Ottimo l'adattamento della Red, in cui la temperatura è sembrata influire poco sulla maturazione. Nella più tardiva White, invece, che pure ha risposto bene come vegetazione, si è registrato un visibile effetto negativo sia sulla maturazione che sul colore delle brattee. La brattea matura della Red è risultata sensibile alla botrite, non riscontrati sintomi nella White nell'unico anno di prova.
- •TRASPORTO/DURATA: test non effettuati.
- •NOTE: la Red rappresenta, ormai da anni, un'interessante alternativa nella tipologia a brattea arricciata per la vigoria, la buona ramificazione, la discreta precocità e le belle infiorescenze. Buon risultato in tutte le taglie testate. La White al primo anno di prova è risultata allineata per le caratteristiche della pianta, ma con tempi sensibilmente diversi di maturazione.