VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO
PO DI TRAMONTANA
DAL 1988

DUMMEN ORANGE

Antares 2019

Vaso 14

2018 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

Serra T alta **tunnel T bassa**

2020

Vaso 14 **Invaso sett.31**

Serra

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

* autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, produce rami molto forti, con discreto portamento a V e assenza di rami secondari. Nel vaso 17 (dato riferito alla vecchia Antares) la legatura non è necessaria.

•**FIORITURA:** tardiva, infiorescenze di medie dimensioni, orizzontali o leggermente assurgenti, un po' corrugate, spesse, di colore rosso intenso. I ciazii non sono numerosi ma grandi, a maturazione tardiva.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: la pianta risponde bene dal punto di vista vegetativo alla coltivazione a bassa T; per una buona distensione delle brattee necessita però di una posizione luminosa e di caldo nelle fasi finali, è consigliabile una T di almeno 16°C fino al 10 dicembre. Piuttosto resistente nei confronti della botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** in piccoli test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee, anche dopo insacchettamento. (dato riferito alla vecchia Antares)

•**NOTE:** ha sostituito la vecchia Antares, di cui ripete la struttura robusta e la grande facilità di coltivazione, ma con maggiore regolarità. E' una pianta rustica, con un apparato radicale forte e scarsa o nulla richiesta di nanizzanti. Particolarmente adatta a climi caldi e alla coltivazione su canaline, in condizioni climatiche e di coltivazione analoghe a quelle dei test appare consigliabile soprattutto per vendite tardive.