VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO
PO DI TRAMONTANA
DAL 1988

LAZZERI

Futura Red-Brilliant

Vaso 17

2015

Red

Brilliant

Serra T media invaso sett.27

2016

Red

Brilliant

Serra T media invaso sett.26

2017 Vaso 14

Invaso sett.31

Red

tunnel **T alta** **T bassa**

Brilliant

tunnel **T alta** **T bassa**

2018 Vaso 14

Invaso sett.31

Red

serra T alta **tunnel T bassa**

Brilliant

serra T alta **tunnel T bassa**

2018 – Vaso 10

Serra T alta **invaso sett. 34**

Red

Brilliant

2019 – Vaso 14

invaso sett.31

Red

serra

tunnel

Brilliant

serra

tunnel

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Red

Brilliant

Serra

Vaso 10 Invaso sett.34

Red

Brilliant

Serra

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2018*

T alta **T bassa**

sett42

Red **Brilliant** **Red** **Brilliant**

sett45

sett48

sett51

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l'effetto del riscaldamento contenuto

maturazione 2019

T alta

Red	Brilliant
18	
18	
18	
18	
20 g 16 n	
20 g 16 n	
20 g 16 n	
18 g 16 n	
16	
16	
15	
14	



Sett.

42

45

48

51

T bassa

Red	Brilliant
18	
17	
16	
15	
15	
14	
14	
14	
13	
13	
12	
12	



maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa. Piante molto regolari con rami non numerosi ma forti, con portamento a V. Nel vaso 17 si ottengono piante di bella struttura ma di taglia contenuta. Non necessaria la legatura dei rami.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze grandi e regolari, orizzontali, di colore rosso intenso. Ciazii grandi e abbastanza numerosi, a maturazione tardiva. La variante Brilliant ha colore più chiaro ed è risultata talvolta leggermente più precoce.

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':** a livello di colorazione risponde bene, soprattutto la Brilliant, ad un contenuto abbassamento della temperatura se ha ricevuto sufficiente riscaldamento in autunno. La pianta appare soffrire forse più che le temperature basse gli ambienti di coltivazione difficili (tunnel bassi con elevata Ur e difficoltà a scaldare la pianta a livello del vaso) in cui tende a manifestare clorosi internervali più o meno marcate. Si consiglia comunque una T minima di coltivazione di 16° almeno per tutto novembre. Contenuta la sensibilità alla botrite della brattea matura.

•**TRASPORTO/DURATA:** in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha evidenziato una buona tenuta sia delle foglie che delle brattee.

•**NOTE:** varietà molto similari, interessanti sia per la struttura, robusta e molto regolare, che per le belle infiorescenze. Richiedono poco o nessun impiego di nanizzanti, mentre va curata l'irrigazione, evitando gli eccessi, per permettere la formazione di un apparato radicale forte. Ottimo risultato nei vasi medio piccoli, buono anche sul vaso 17; per ottenere una taglia maggiore si consiglia eventualmente di anticipare di una settimana l'invaso.