



SELECTA Vesuvio



Vaso 17

2012

serra
T media
Invaso
sett.27



2013
serra
T media
Invaso
sett.27



Vaso 17

2014

serra
T media
Invaso
sett.27



2015
serra
T media
Invaso
sett.27



Vaso 14 2012 invaso sett. 31



Tunnel T media T molto bassa

2013 **invaso sett. 31**



Tunnel T media T bassa

Vaso 14 2014 invaso sett. 31



Tunnel T media T bassa

2015 **invaso sett. 31**



Tunnel T media T bassa

Vaso 14

Invaso sett.31



Serra

maturazione 2012

• Sett. 42

• Sett.45



T impostate riscaldamento

• Sett.48



molto bassa (dicembre)









maturazione 2014 (autunno molto caldo)

• Sett. 42

• Sett.45

T impostate riscaldamento

• Sett.48

• Sett. 51





maturazione 2015


Sett. 42

Sett.45

T impostate

Sett.48

Sett. 51



maturazione 2020

Sett.	T	IIId
40	18	
41	18	
42	18	
43	18	
44	18 giorno 16 notte	
45	18 giorno 16 notte	
46	18 giorno 16 notte	
47	18 giorno 16 notte	
48	16	
49	16	
50	15	
51	15	



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

- •PIANTA: molto vigorosa, produce rami molto robusti, con portamento a V, senza ramificazione secondaria. La legatura dei rami non è indispensabile ma può risultare utile.
- •FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze grandi con brattee rosso intenso. Ciazii non appariscenti, ad apertura tardiva.
- •RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': risponde bene ad un contenuto abbassamento finale della T, sempre che abbia ricevuto sufficiente riscaldamento in autunno. A brattea matura, in condizioni di elevata Ur, presenta una media sensibilità alla botrite.
- •TRASPORTO/DURATA: in un piccolo test, dal valore solo indicativo, ha mostrato una discreta tenuta sia delle foglie che delle brattee.
- •NOTE: varietà interessante soprattutto per la produzione di piante molto grandi. Richiede un costante impiego di nanizzanti, anche perchè tende a presentare una forte dominanza apicale, attenzione però all'impiego post induzione, soprattutto a dosi elevate, che rischia di compromettere la dimensione finale delle infiorescenze. Per contenerne la crescita riducendo l'impiego di nanizzanti si consiglia di ritardare l'invaso di 1 settimana.