VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

SYNGENTA

Mirage Red

2016

Vaso 17

Serra **T alta** **Invaso sett.28**

Vaso 14

2017 **invaso sett.32**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2018 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2019

Vaso 14 **invaso sett.31**

Serra T alta **Tunnel T bassa**

Vaso 10 **invaso sett.34**

Serra

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

2020

Vaso 14 Invaso sett.31

Serra

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

maturazione 2017

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.51

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.	T bassa
18	40	18
18	41	17
18	42	16
18	43	15
20 g 16 n	44	15
20 g 16 n	45	14
20 g 16 n	46	14
18 g 16 n	47	14
16	48	13
16	49	13
15	50	12
14	51	12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-bassa, ramificazione robusta senza rami secondari e buon portamento a V. Non necessaria la legatura dei rami nel vaso 17.

•**FIORITURA:** precoce come inizio colorazione, medio-precoce come maturazione finale. Infiorescenze cuoriformi, orizzontali, di colore rosso intenso. I ciazii sono numerosi e molto grandi, durevoli.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': nelle condizioni dei test più drastici a bassa T ha evidenziato tendenza a schiarimenti fogliari e brattee piccole e molto scure. In condizioni di autunno caldo e/o con un contenuto abbassamento della T la vegetazione ha risposto meglio, resta comunque evidente la riduzione del diametro delle brattee. Contenuta la sensibilità alla botrite della brattea matura.

•**TRASPORTO/DURATA:** test non effettuati. Per la struttura è risultata facile da insacchettare.

•**NOTE:** varietà affermata, conferma le ottime caratteristiche di affidabilità per l'uniformità, l'ottima struttura, la robustezza dei rami e le belle infiorescenze. Di facilissima coltivazione nelle taglie medio-piccole con scarso uso di nanizzanti. La riduzione di taglia osservata nel vaso 17 (da considerare anche l'invaso ritardato di 2 settimane) non è sembrata precluderne tale impiego, necessita però di ulteriori verifiche.