LAZZERI

BRASILEIRA **

** Serie nuovissima in fase di costruzione. Le varietà descritte potrebbero non corrispondere a quelle scelte per la serie commerciale.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23*

brasileira
RED

brasileira
DARK RED

brasileira
WHITE

brasileira
CREAM PINK

brasileira
PINK

* Foto di piante non cimate

DATI PROVE COLTIVAZIONE

2020-Invaso sett.10										
VARIETA'	tipo talea	cimato / non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.		
								20	22	24
White	NC	CIM	mf	4	e	2	9-10	0	5	100
		NC	mf	4	e	4		0	30	100
Cream Pink	NC	CIM	mf	4	ea	1	9,5	0	10	100
		NC	mf	4	ea	2		0	100	100
Pink	NC	CIM	m	4	ea	1	9-10	0	10	100
		NC	mf	4	ea	3		0	80	100
Red	NC	CIM	m	5	ea	1	8-9	0	5	100
		NC	mf	5	ea	2		0	30	100
Dark Red	NC	CIM	mf	5	ea	3	8,5-9,5	0	70	100
		NC	mf	4	all	4		0	100	100

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Tipo di talea: NC= non cimata CIM 2X = cimata 2 volte

Vigoria:

- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

precocità: (2019)

- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.
(2020)

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VIGORIA**: generalmente medio-forte, con qualche piccola variazione, e con una leggera riduzione indotta dalla cimatura, soprattutto in un paio di varietà.

•**PORTAMENTO**: eretto nella White, eretto/allargato nella altre. La cimatura non ha influito in modo importante nel portamento, eccetto nella Dark Red che, in fase avanzata, è risultata piuttosto allargata.

•**FIORITURA**: medio-precoci la Cream Pink, Pink e Dark Red, media la Red e piuttosto tardiva la White. L'effetto ritardante della cimatura è risultato più marcato nelle varietà più precoci. Grandi i fiori, soprattutto nella White e Pink. Leggere note di rosa sono presenti nel bianco . Attraente la Cream Pink per l'intensa gola gialla.

•**CIMATURA**: Da quanto osservato sulle varietà in cui è stato fatto il test cimato/non cimato, l'unico vantaggio della cimatura risiede nella riduzione della produzione di tralci. (foto qui sotto)

cimato **non cimato**

Test estivo-2020

White

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020

Pink

1 –10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020

Cream Pink

1 –10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020

Red

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020 Dark Red

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

RISULTATI TEST ESTIVO

•**VIGORIA E RICADENZA:** la vigoria è risultata generalmente medio forte. Il portamento è risultato più eretto nella White, discretamente ricadenti le altre.

•**FIORITURA:** la rifiorenza è stata ottima nelle due varietà rosa, buona nella White e Red. La Dark Red ha mostrato una buona rifiorenza estiva, con una riduzione a fine stagione. Positive le valutazioni per quanto riguarda la resistenza al sole dei fiori, anche nelle solitamente delicate colorazioni rosse. La White ha mantenuto le note di rosa già osservate in coltivazione.

NOTA riguardante le foto del test estivo: per un errore di etichettatura, in parte delle foto risulta erroneamente come nome della serie 'Amore mio'.

NOTE COMPLESSIVE

•Da quanto emerso nelle varietà presenti in valutazione pre commerciale, ha mostrato caratteristiche generali che ben si adattano al tipo di coltivazione del test. Solo la produzione di tralci è risultata importante .

•Adatte all'uso in fioriera, dove creano anche un discreto effetto in ricadenza.

•Data la novità assoluta della serie, ulteriori valutazioni sono particolarmente necessarie. E' da attendersi anche la probabile sostituzione di alcune delle varietà testate con evoluzioni migliorate.