

SEMINA MAIS: COSA FARE

(*) *A. brevis* anno-1: 210
A. brevis anno-2: 450
A. sordidus anno-1: 1100
A. ustulatus anno-2: 1000



PRESENZA FATTORI DI RISCHIO DI ATTACCO ELATERIDI

sostanza organica > 5%, cattivo drenaggio, avvicendamento con copertura continua vegetale – prati, doppi raccolti (rischio basso se copertura da cover crops), attacchi precedenti, elevata presenza attorno di prati naturali o coltivati, elevate catture con trappole Yf (*)

ASSENZA FATTORI DI RISCHIO DI ATTACCO ELATERIDI

ALTRI FATTORI DI RISCHIO

PRATO
come precessione

TRAPPOLE PER LARVE

Aratura
autunnale

Aratura
primaverile

Trappole
sopra soglia

TRAPPOLE SOTTO SOGLIA
< 1 larva/tr *A. brevis*,
< 2 l/tr *A. sordidus*,
< 5 l/tr *A. ustulatus*, *A. litigiosus*

Conferma mais

Spostamento coltura in
appezzamento a basso
rischio

NO TRATTAMENTI
INSETTICIDI
(concianti o geodisinfestanti)

INTERVENTO DI CONTROLLO
(con priorità alle soluzioni alternative agli
insetticidi chimici di sintesi)