LANNES*

Diamantina Jade **

*Talee fornite da Podere Luen e da Lannes

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l'intera serie. Data inoltre la dinamicità nella composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori.

Fine prova coltivazione 2020-sett.23*

* Foto di piante non cimate

Fine prova coltivazione 2021-sett.23

DATI PROVE COLTIVAZIONE*

2020-Invaso sett.12									
VARIETA'	**cimato / non cimato**	**vigoria**	**ramif**	**port**	**tralcio**	**diametro fiore cm**	**% pp fiorite sett.**		
							20	**22**	**24**
Jade Grenat	CIM	mb	4	ea	2	8,5-10	0	5	90
	NC	mf	5	e	2		0	20	100
Jade Red	CIM	mb	4	ea	1	8,5-9,5	0	50	80
	NC	m	3	e	0		70	100	100
Jade Scarlet	CIM	m	2	ea	2	8-9	0	30	70
	NC	m	2	e	1		50	100	70
Jade Rose	CIM	mb	3	ea	1	8-9	0	10	50
	NC	mf	3	e	0		60	100	100
Jade Pink	CIM	mb	3	ea	1	8-9	0	5	80
	NC	m	4	ea	1		60	90	100
Jade White	CIM	m	4	ea	3	9	0	5	100
	NC	mf	4	ea	2		30	90	100

2021-Invaso sett.12									
VARIETA'	vigoria	ramif	port	Tralcio sett.20	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.			
						18	19	20	23
Jade Scarlet	mb	3	e	0	9	0	15	20	50
Jade Pink	mb	3	e	0	8	0	0	20	50
Jade Rose	mb	4	e	0	8	0	0	15	70
Jade White	m	4	ea	0	8	0	10	30	100

* tutti test effettuati partendo da talee di punta senza cimature pregresse

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Vigoria:

- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

precocità: (2019)

- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.
(2020-2021)

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VIGORIA**: generalmente media, con qualche piccola variazione. La cimatura ha causato un rallentamento della crescita più o meno marcato.

•**PORTAMENTO**: generalmente eretto o eretto/allargato, La cimatura ha, in modo più o meno evidente, abbassato le piante allargandone il portamento.

•**FIORITURA**: precocità generalmente buona, come pure la dimensione dei fiori. La cimatura ha ritardato la fioritura in modo evidente, eccetto nella Grenat che è risultata anche la più tardiva.

•**CIMATURA**: Da quanto osservato sulle varietà in cui è stato fatto il test cimato/non cimato, con questi tempi di invaso il leggero vantaggio nel portamento un po' più ordinato della pianta non compensa il ritardo di crescita e di fioritura. (es. in foto)

cimato **non cimato**

Test estivo-2020

Jade White

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Jade White

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2020

Jade Pink

1 –10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Jade Pink

1 – 21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2020

Jade Rose

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Jade Rose

1 – 21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2020

Jade Red

1 – 10lug

2 – 21lug

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2020

Jade Scarlet

1 – 10lug

2 – 21lug

3 – 6ago

4 – 26ago

5 – 11set

Test estivo-2021

Jade Scarlet

1 – 21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

RISULTATI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** la vigoria è risultata variabile, passando dalle più compatte rosa, per passare alle medie rosse alla più esuberante bianca .

Il portamento è risultato eretto e arrotondato nelle due varietà rosa, più a 'cuscino' la Red, discretamente ricadente la Scarlet, mentre la vigorosa White si è sviluppata sia in altezza che in ricadenza, dando un ottimo impatto estetico.

•**FIORITURA:** la rifiorenza è stata generalmente da buona a ottima, in particolare nella White. Un po' meno fiorifere le due varietà a fiori rosa, migliore tra le due la Rose.

Buona la produzione di fiori delle due varietà rosse: la Red ha prodotto fiori più grandi ma più sensibili al sole rispetto alla Scarlet.

NOTE COMPLESSIVE

•Serie affermata da tempo, ha mostrato caratteristiche di portamento, compattezza e precocità che ben si adattano ad una coltivazione veloce senza interventi di cimatura e uso di nanizzanti.

•Adatte all'uso in fioriera, ove non sia richiesta forte ricadenza.

•Anche nel secondo anno di test l'invaso è stato tardivo. L'aspetto va tenuto in particolare considerazione nella valutazione data l'importanza di due settimane di coltivazione in un ciclo così veloce.