VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

LAZZERI

Serena Red

Vaso 17

2013

serra
T media

invaso
sett.27

2014

serra
T media

invaso
sett.27

Vaso 17

2015

serra
T media

invaso
sett.27

2016

serra
T media

invaso
sett.26

Vaso 14

2016 invaso sett.31

tunnel T media T bassa

2017 invaso sett.31

tunnel T alta T bassa

Vaso 14

2017 **invaso sett.31**

Tunnel T alta **tunnel T bassa**

2019 **invaso sett.31**

impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2019

Vaso 14

2020 **Invaso sett.31**

Vaso 10

2021 **Invaso sett.33**

impostazioni T°: vedi schede maturazione 2020-2021

2022

Vaso 14 **Invaso sett.30**

Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2022

maturazione 2018*

- Sett.42

T impostate riscaldamento → **alta** **bassa**

- Sett.45

- Sett.48

- Sett.50

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato l'effetto delle basse T nella prova relativa

maturazione 2019

T alta	Sett.
18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51

T bassa
18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15

maturazione 2021

Sett.	T
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15

maturazione 2022

Sett.	T
40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria medio-forte, ramifica molto anche con rami secondari. Pianta regolare con rami robusti con portamento a V; la legatura nel vaso 17 non è necessaria, può però risultare utile in caso di ramificazione molto abbondante.

•**FIORITURA:** media precocità, infiorescenze medio-grandi, orizzontali o leggermente ricadenti, rosso chiaro. Ciazii numerosi e grandi, a maturazione tardiva.

20/12/2022

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘:** la pianta risponde bene ad un moderato abbassamento della T; il diametro delle infiorescenze ne risente invece in modo visibile, si consiglia quindi di mantenere 16° almeno fino al 15-20 novembre. Le brattee mature sono, in condizioni favorevoli alla malattia, mediamente sensibili alla botrite.

•**TRASPORTO/DURATA:** da un piccolo test preliminare dal valore indicativo è emersa un’ottima tenuta delle brattee, discreta quella delle foglie. Struttura della ramificazione e posizione delle infiorescenze la rendono adatta all’insacchettamento

•**NOTE:** rappresenta un ottimo compromesso tra facilità di coltivazione, anche in densità, e caratteristiche estetiche. Uniforme e regolare anche senza forte uso di nanizzanti, è versatile sia nei confronti della taglia coltivata che del periodo di vendita.