VENETO AGRICOLTURA

CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA DAL 1988

SUNTORY*

Sundaville UP

* Talee fornite da Padana

Fine prova coltivazione

2019-SETT.24

Apricot

Scarlet

2020-SETT.23

Scarlet

Fine prova coltivazione

2021-SETT.23

2022-SETT.23

DATI PROVE COLTIVAZIONE

2019-Invaso sett.13						
VARIETA'	tipo talea	vig	ramif	port	precocità	tralcio
Apricot	PNC	ff	4	e	m/t	4
Scarlet	PNC	f	3	e	m	4

2020-Invaso sett.10										
VARIETA'	tipo talea	cimato/ non cimato	vigoria	ramif	port	tralcio	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.		
								20	22	24
Scarlet	Nodo C	CIM	5	3	e	1	9-10	0	100	100
		NC	5	3	e	1		50	100	100

2021-Invaso sett.11										
VARIETA'	tipo talea	vigoria	ramif	port	tralcio sett.20	diametro fiore cm	% pp fiorite sett.			
							18	19	20	23
Scarlet	Nodo C	f	3	e	0	9	40	50	60	100

2022-Invaso sett.12									
VARIETA'	tipo talea	vigoria	ramif	port	tralcio sett.19	% pp fiorite sett.			
						20	21	22	23
Scarlet	Nodo C	mf	3	e	0	60	65	100	100

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE

Tipo di talea: PNC= punta non cimata Nodo C= nodo cimata

Vigoria:

- bb = molto bassa
- b = bassa
- mb = medio/bassa
- m= media
- mf = medio/forte
- f = forte
- f f= molto forte

Ramificazione: da 1 a 5

Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto ea= eretto-allargato all= allargato

precocità: (2019)

- t = tardiva
- mt = medio/tardiva
- m= media
- mp= medio/precoce
- p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.

Nota: le settimane di rilevazione non sono le stesse nei 3 anni di test

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE

•**VEGETAZIONE**: vigoria da forte a molto forte. Nonostante la forte crescita, si tratta però di piante con richieste idriche contenute. Il portamento è marcatamente eretto. La produzione di tralci è stata abbondante nel primo anno, caratterizzato da anomalia climatica per le basse temperature e luminosità di maggio. Negli anni successivi, in cui però è stata testata solo la Scarlet, con primavere più calde e soprattutto luminose, si è invece mostrata contenuta o nulla.

•**FIORITURA**: Nel 2019, con invaso tardivo e una tarda primavera molto fredda, sono risultate medio-tardive. Nei due anni successivi invece la Scarlet ha mostrato un'ottima precocità, poco ridotta dalla cimatura. Grandi i fiori nella Scarlet, un po' meno nella Apricot.

•**CIMATURA**: in questa serie, caratterizzata da piante con una forte spinta alla crescita verticale, la cimatura può essere uno strumento utile per l'ottenimento di un prodotto più equilibrato. Nella pianta a sx in foto sono state effettuate cimature ripetute, tagliando sempre sopra un bocciolo.

Test estivo-2019

Scarlet

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 10ago

4 – 30ago

5 – 10set

Test estivo-2020 Scarlet

Fioriera

Tutore

25 giu

21 lug

10 ago

Test estivo-2020 Scarlet

Fioriera

Tutore

26 ago

11 set

Test estivo-2021

Scarlet

1 –21giu

2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

Test estivo-2022 Scarlet

1 – 22giu

2 – 13lug

3 – 3ago

4 – 30ago

5 – 14set

Test estivo-2019 Apricot

1 – 15lug

2 – 31lug

3 – 7ago

4 – 30ago

5 – 10set

RISULTATI DEI TEST ESTIVI

•**VIGORIA E RICADENZA:** Vigoria molto forte. Il portamento, pur inizialmente molto eretto, non ha favorito l'utilizzo su tutore, ma, al contrario, ha portato a una ricadenza marcata anche dove il tutore era presente (confronto effettuato solo sulla Scarlet nel 2020).

•**FIORITURA:** superata la fase in cui le ramificazioni presenti al momento dell'invaso della fioriera passano da erette a ricadenti e viene stimolata, più che la fioritura, la nuova ramificazione, la rifiorenza è particolarmente abbondante in entrambe. Di particolare impatto la fioritura della Scarlet sia per la colorazione brillante che per l'ottima tenuta del colore al sole. Ottimo anche l'effetto della massa di fiori della Apricot con l'unica pecca della forte sensibilità all'umidità a fine stagione.

NOTE COMPLESSIVE

•Serie del tutto particolare per il portamento, per la forte vigoria necessita della corretta gestione in coltivazione, soprattutto in vasi piccoli, con l'abbinamento di cimature e, presumibilmente, nanizzanti (non effettuati nel test).

•Di particolare interesse il risultato in fioriera per la forte ricadenza che si può ottenere anche con piante ottenute da una coltivazione veloce.

•Come si riscontra in tutte le varietà di questa tonalità, particolarmente positiva la risposta della Apricot in pieno sole.