

DUMMEN ORANGE

Frozen



2019

Vaso 14 Invaso sett.31

**serra
T alta**



**Tunnel
T bassa**



2020


Vaso 14

Invaso sett.31



Vaso 10

Invaso sett.34



Impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2020

2021

Vaso 14

Invaso sett.30



Vaso 10

Invaso sett.33



impostazioni T°: vedi scheda maturazione 2021

Vaso 14

2022

Invaso sett.30



2023

Invaso sett.30



*impostazioni T°: vedi schede maturazione 2022 e 2023

T alta Sett.

maturazione 2019

T bassa

18	40
18	41
18	42
18	43
20 g 16 n	44
20 g 16 n	45
20 g 16 n	46
18 g 16 n	47
16	48
16	49
15	50
14	51



18
17
16
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12

maturazione 2020

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15
51	15



maturazione 2021

Sett. T

40	18
41	18
42	18
43	18
44	18 giorno 16 notte
45	18 giorno 16 notte
46	18 giorno 16 notte
47	18 giorno 16 notte
48	16
49	16
50	15



maturazione 2022

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



maturazione 2023

Sett. T

40	16
41	16
42	16
43	16
44	16
45	15
46	15
47	14
48	14
49	14
50	14
51	14



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**PIANTA:** vigoria media, ramificazione abbondante, anche con rami secondari. Portamento a V. Non testata nel vaso 17.



•**FIORITURA:** tardiva, infiorescenze allungate, orizzontali o leggermente ricadenti, colore bianco puro. Ciazii numerosi e grandi, a maturazione, come le brattee, molto influenzata dalle temperature nelle ultime fasi della coltivazione.



21/12/2021



20/12/2022



19/12/2023

INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•**RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'**: non è risultata adatta per coltivazioni a bassa T, soprattutto per l'insufficiente maturazione delle brattee. Non riscontrati sintomi di botrite.

•**TRASPORTO/DURATA**: test non effettuati; la pianta è risultata di facile insacchettamento.

•**NOTE**: varietà interessante per l'uniformità, la struttura e l'ottimo punto di bianco che nel complesso ne fanno a maturazione una pianta molto attraente. E' risultata inoltre di facile coltivazione e non ha richiesto forte impiego di nanizzanti.

Data l'abbondante ramificazione, per ottenere infiorescenze di dimensioni ottimali non è consigliabile cimare alto.

Si tratta inoltre di una varietà decisamente tardiva che acquista il suo valore estetico nell'ultimo periodo di maturazione: richiede quindi un adeguato riscaldamento (17-18°) fino a tutto novembre, ed è adatta all'ultimo periodo di vendita. Ottimo il risultato in entrambe le taglie testate.